

AMNIOCENTESIS

RECOMENDACIONES

- No es necesario que haga una preparación especial.
- Procure no acudir con la vejiga de la orina totalmente vacía. No orine de 30 a 60 minutos antes de la cita.
- Es imprescindible que acuda acompañada por su marido, algún familiar o amiga.
- Durante la punción procure estar relajada, no es mas molesta que una inyección o una extracción de sangre.
- Es necesario el reposo relativo en cama o sofa durante las 24 horas siguientes a la punción.
- La perdida de líquido amniótico a través de la vagina es la complicación mas probable que puede tener, y normalmente se resuelve sin problemas. Unicamente debe de guardar reposo en cama hasta que durante 24 horas no haya perdido liquido.
- Es conveniente que no tenga relaciones sexuales durante los 7 días siguientes.
- Si tiene dolor o perdida de sangre no se alarme, en la mayor parte de los casos la gestación continua sin incidencias. En este caso o ante cualquier duda póngase en contacto con su Ginecólogo o llame al 976 2709971.
- Dentro de una semana le practicaremos una ecografía de control para confirmar que su embarazo evoluciona con normalidad, salvo que se la realice su ginecólogo.

ATENCIÓN : Si es Rh negativa es necesario que se ponga una inyección intramuscular de gammaglobulina anti-D tras la punción. Asegúrese de que se le administra.